

乳がん

2000011	トラスツズマブBS単剤 (3週間毎)				
2000020	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2 ~ day21
	トラスツズマブ	点滴静注	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	○	休薬

2000030	トラスツズマブBS (3週間毎) + GEM						
2000040	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2 ~ day7	day8	day9 ~ day21
	トラスツズマブ	点滴静注	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	○	休薬		
	ゲムシタビン (GEM)	点滴静注	1250mg/m ²	○	休薬	○	休薬

2000070	トラスツズマブBS (3週間毎) +VNR						
2000080	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2 ~ day7	day8	day9 ~ day21
	トラスツズマブ	点滴静注	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	○	休薬		
	ナベルピン (VNR)	点滴静注	25mg/m ²	○	休薬	○	休薬

2000150	トラスツズマブBS (3週間毎) +DTX				
2000160	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2 ~ day21
	トラスツズマブ	点滴静注	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	○	休薬
	ドセタキセル (DTX)	点滴静注	60mg/m ²	○	

2000170	ペルツズマブ+トラスツズマブBS				
2000180	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2 ~ day21
	ペルツズマブ	点滴静注	初回840mg 2回目以降420mg	○	休薬
	トラスツズマブ	点滴静注	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	○	

2000050	ペルツズマブ+トラスツズマブBS+DTX				
2000060	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2 ~ day21
	ペルツズマブ	点滴静注	初回840mg 2回目以降420mg	○	休薬
	トラスツズマブ	点滴静注	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	○	
	パクリタキセル (PTX)	点滴静注	75mg/m ²	○	

2000090	ベルツズマブ+トラスツズマブBS+GEM						
2000100	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day7	day8	day9～day21
	ベルツズマブ	点滴静注	初回840mg 2回目以降420mg	○	休薬		
	トラスツズマブ	点滴静注	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	○	休薬		
	ゲムシタビン (GEM)	点滴静注	1250mg/m ²	○	休薬	○	休薬

2000130	ベルツズマブ+トラスツズマブBS+VNR						
2000140	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day7	day8	day9～day21
	ベルツズマブ	点滴静注	初回840mg 2回目以降420mg	○	休薬		
	トラスツズマブ	点滴静注	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	○	休薬		
	ナベルピン (VNR)	点滴静注	25mg/m ²	○	休薬	○	休薬

2000191	FEC100						
2000201	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day21		
	エピルビシン (EPI)	点滴静注	100mg/m ²	○	休薬		
	シクロホスファミド (CPA)	点滴静注	500mg/m ²	○	休薬		
	5-FU	点滴静注	500mg/m ²	○	休薬		

2000220	TC						
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day21		
	ドセタキセル (DTX)	点滴静注	75mg/m ²	○	休薬		
	シクロホスファミド (CPA)	点滴静注	600mg/m ²	○	休薬		

2000230	nab-PTX A法						
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day21		
	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	点滴静注	260mg/m ²	○	休薬		

2000240	エリブリン						
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day7	day8	day9～day21
	エリブリン	点滴静注	1.4mg/m ²	○	休薬	○	休薬

2000260	ベバシズマブ+PTX								
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day7	day8	day9～day14	day15	day16～day28
	バクリタキセル (PTX)	点滴静注	90mg/m ²	○	休薬	○	休薬	○	休薬
ベバシズマブ	点滴静注	10mg/kg	○	休薬			○		

2000280 2000290	トラスツズマブエムタンシン				
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day21
	トラスツズマブエムタンシン	点滴静注	3.6mg/kg	○	休薬

	パルボシクリブ+レトロゾール				
	薬品名	投与方法	投与量	day1～day21	day22～day28
	パルボシクリブ	経口	125mg/回 1日1回	→	休薬
	レトロゾール	経口	2.5mg/回 1日1回	連日投与	

	パルボシクリブ+フルベストラント							
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2-day14	day15	day16-day21	day22-day28
	パルボシクリブ	経口	125mg/回 1日1回	→			休薬	
	フルベストラント	筋肉内投与	500mg	○	休薬	(初回○)	休薬	

	アベマシクリブ+フルベストラント						
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2-day14	day15	day16-day28
	アベマシクリブ	経口	150mg/回 1日2回	連日投与			
	フルベストラント	筋肉内投与	500mg	○	休薬	(初回○)	休薬