

大腸がん

2200340 ロンサーフ®+ベバシズマブ(BV) (4週間毎)		投与方法	投与量	day1	day2 ~ day5	day6	day7	day8	day9-12	day13	day14	day15	day16-day28
	薬品名												
	ベバシズマブ(BV)	点滴静注	5 mg/kg	○	休薬							○	休薬
	トリフルリジン・チベラシル (TAS-102)	経口	1回35mg/m ² 1日2回	夕○	朝○	夕○	○朝	休薬	夕○	朝○	夕○	○朝	休薬

2200011 FOLFIRI±ラムシルマブ		投与方法	投与量	day1	day2 ~ day3	day4-14
	薬品名					
2200201	ラムシルマブ(RAM)	点滴静注	8 mg/kg	○	休薬	
2200211	イリノテカン (CPT-11)	点滴静注	150 mg/m ²	○		
	レボホリナート(I-LV)	点滴静注	200 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル(5-FU)	急速静注	400 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル(5-FU)	持続静注	2400 mg/m ²	→(46時間)		休薬

2200061 FOLFIRI±ベバシズマブ(BV)		投与方法	投与量	day1	day2 ~ day3	day4-14
	薬品名					
2200201	ベバシズマブ(BV)	点滴静注	5 mg/kg	○	休薬	
2200211	イリノテカン (CPT-11)	点滴静注	150 mg/m ²	○		
	レボホリナート(I-LV)	点滴静注	200 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル(5-FU)	急速静注	400 mg/m ²	○		
	フルオロウラシル(5-FU)	持続静注	2400 mg/m ²	→(46時間)		休薬

2200101 FOLFIRI±パニツムマブ		投与方法	投与量	day1	day2 ~ day3	day4-14
	薬品名					
2200201	パニツムマブ	点滴静注	6mg/kg	○	休薬	
2200211	イリノテカン (CPT-11)	点滴静注	150mg/m ²	○		
	レボホリナート(I-LV)	点滴静注	200mg/m ²	○		
	フルオロウラシル(5-FU)	急速静注	400mg/m ²	○		
	フルオロウラシル(5-FU)	持続静注	2400mg/m ²	→(46時間)		休薬

2200080	mFOLFOX6±ベバシズマブ(BV)					
2200090	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day3	day4-14
2200220	ベバシズマブ(BV)	点滴静注	5mg/kg	○	休薬	
2200230	オキサリプラチン(I-OHP)	点滴静注	85mg/m ²	○		
	レボホリナート(I-LV)	点滴静注	200mg/m ²	○		
	フルオロウラシル(5-FU)	急速静注	400mg/m ²	○		
	フルオロウラシル(5-FU)	持続静注	2400mg/m ²		→(46時間)	休薬

2200080	mFOLFOX6±パニツムマブ					
2200090	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day3	day4-14
2200220	パニツムマブ	点滴静注	6mg/kg	○	休薬	
2200230	オキサリプラチン(I-OHP)	点滴静注	85mg/m ²	○		
	レボホリナート(I-LV)	点滴静注	200mg/m ²	○		
	フルオロウラシル(5-FU)	急速静注	400mg/m ²	○		
	フルオロウラシル(5-FU)	持続静注	2400mg/m ²		→(46時間)	休薬

2200180	CapeOX130 ±ベバシズマブ(BV)						
2200190	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day14	day15	day16～day21
2200240	ベバシズマブ (BV)	点滴静注	7.5 mg/kg	○	休薬		
2200250	オキサリプラチン(L-OHP)	点滴静注	130 mg/m ²	○			
	カベシタビン(Cape)	経口	1000 mg/m ² /回 1日2回	夕○	朝○ 夕○	○朝	休薬

2200180	SOX130 ±ベバシズマブ(BV)						
2200190	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day14	day15	day16～day21
2200240	ベバシズマブ (BV)	点滴静注	7.5 mg/kg	○	休薬		
2200250	オキサリプラチン(L-OHP)	点滴静注	130 mg/m ²	○			
	テガフル・ギメラシル・オテラシル (S-1)	経口	40 mg/m ² /回 1日2回	夕○	朝○ 夕○	○朝	休薬

※S-1使用時の体表面積は藤本式を用いる

2200161	IRIS±パニツムマブ						
2200151	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day14	day15	day16-day28
	パニツムマブ	点滴静注	6mg/kg	○	休薬	○	休薬
	イリノテカン (CPT-11)	点滴静注	125mg/m ²	○		○	
	テガフル・ギメラシル・オテラシル (S-1)	経口	40 mg/m ² /回 1日2回	夕○	朝○ 夕○	○朝	

※S-1使用時の体表面積は藤本式を用いる

2200171	IRIS±ベバシズマブ						
2200151	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day14	day15	day16-day28
	ベバシズマブ(BV)	点滴静注	5mg/kg	○	休薬	○	休薬
	イリノテカン (CPT-11)	点滴静注	125mg/m ²	○		○	
	テガフル・ギメラシル・オテラシル (S-1)	経口	40 mg/m ² /回 1日2回	夕○	朝○ 夕○	○朝	

※S-1使用時の体表面積は藤本式を用いる

2200260	sLV5FU2±ベバシズマブ(BV)					
2200271	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day3	day4-14
2200280	ベバシズマブ(BV)	点滴静注	5mg/kg	○	休薬	
2200290	レボホリナート(I-LV)	点滴静注	200mg/m ²	○		
	フルオロウラシル(5-FU)	急速静注	400mg/m ²	○		
	フルオロウラシル(5-FU)	持続静注	2400mg/m ²	→(46時間)		休薬

2200320	sLV5FU2±パニツムマブ					
2200330	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day3	day4-14
2200280	パニツムマブ	点滴静注	6mg/kg	○	休薬	
2200290	レボホリナート(I-LV)	点滴静注	200mg/m ²	○		
	フルオロウラシル(5-FU)	急速静注	400mg/m ²	○		
	フルオロウラシル(5-FU)	持続静注	2400mg/m ²	→(46時間)		休薬

22000310	S-1±ベバシズマブ(BV)						
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day14	day15	day16-day21
	ベバシズマブ(BV)	点滴静注	7.5mg/kg	○	休薬		
	テガフル・ギメラシル・オテラシル (S-1)	経口	40 mg/m ² /回 1日2回	夕○	朝○ 夕○	○朝	休薬

2200051	イリノテカン(CPT-11)±パニツムマブ				
2200141	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2 ~ day14
	パニツムマブ	点滴静注	6mg/kg	○	休薬
	イリノテカン (CPT-11)	点滴静注	150mg/m ²	○	