

胃がん

2100010	トラスツズマブ+CDDP+Cape/S-1									
2100020	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2	day3-day14	day15	～	day21	
	トラスツズマブ	点滴静注	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	○	← 休薬 →					
	シスプラチン (CDDP)	点滴静注	80mg/m ²	○						
	カペシタビン (Cape) 又は テガフル・ギメラシル・オテラシル (S-1)	経口	1回 1000mg/m ² 1日2回朝夕食後 1回40mg/m ² 1日2回 朝夕食後	夕○	朝○ 夕○	→	○朝	休薬		

※S-1使用時の体表面積は藤本式を用いる

2100050	SOX100 +トラスツズマブ									
2100060	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2	day3-day14	day15	～	day21	
2100090	トラスツズマブ	点滴静注	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	○	← 休薬 →					
2100100	オキサリプラチン (L-OHP)	点滴静注	100mg/m ²	○						
	テガフル・ギメラシル・オテラシル (S-1)	経口	1回40mg/m ² 1日2回 朝夕食後	夕○	朝○ 夕○	→	○朝	休薬		

※S-1使用時の体表面積は藤本式を用いる

2100070	CapeOX130 / SOX130 +トラスツズマブ									
2100080	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2	day3-day14	day15	～	day21	
2100110	トラスツズマブ	点滴静注	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	○	← 休薬 →					
2100120	オキサリプラチン (L-OHP)	点滴静注	130mg/m ²	○						
	カペシタビン (Cape) 又は テガフル・ギメラシル・オテラシル (S-1)	経口	1回 1000mg/m ² 1日2回朝夕食後 1回40mg/m ² 1日2回 朝夕食後	夕○	朝○ 夕○	→	○朝	休薬		

※S-1使用時の体表面積は藤本式を用いる

2100150	オプジーボ® (ニボルマブ)									
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2	～	day14			
	ニボルマブ	点滴静注	240mg/body	○	← 休薬 →					

2100160	サイラムザ® (ラムシルマブ) +PTX								
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day8	day15	day16 ~ day28		
	ラムシルマブ	点滴静注	8mg/kg	○	休薬	○	休薬		
パクリタキセル (PTX)	点滴静注	80mg/m ²	○	○	○				

2100220	サイラムザ® (ラムシルマブ) (単剤)				
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2-14
	ラムシルマブ	点滴静注	8mg/kg	○	休薬

2100230 2100240	SOX100								
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2	day3-day14	day15	~	day21
	オキサリプラチン (L-OHP)	点滴静注	100mg/m ²	○	← 休薬 →				
	テガフル・ギメラシル・オテラシル (S-1)	経口	1回40mg/m ² 1日2回 朝夕食後	夕○	朝○	夕○	→	○朝	休薬

※S-1使用時の体表面積は藤本式を用いる

2100180 2100190	SP								
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2	day3-day14	day15	~	day21
	シスプラチン (CDDP)	点滴静注	100mg/m ²	○	← 休薬 →				
	テガフル・ギメラシル・オテラシル (S-1)	経口	1回40mg/m ² 1日2回 朝夕食後	夕○	朝○	夕○	→	○朝	休薬

※S-1使用時の体表面積は藤本式を用いる

2100210	ドセタキセル + S-1								
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2	day3-day14	day15	~	day21
	ドセタキセル (DTX)	点滴静注	40mg/m ²	○	← 休薬 →				
	テガフル・ギメラシル・オテラシル (S-1)	経口	1回40mg/m ² 1日2回 朝夕食後	夕○	朝○	夕○	→	○朝	休薬

※S-1使用時の体表面積は藤本式を用いる