

乳がん

2000012	トラスツズマブBS単剤 (3週間毎)				
2000021	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2 ~ day21
	トラスツズマブ	点滴静注	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	○	休薬

2000032	トラスツズマブBS (3週間毎) +GEM					前投薬：パロセトロン 0.75mg、デキサメタゾン 6.6mg	
2000042	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2 ~ day7	day8	day9 ~ day21
	トラスツズマブ	点滴静注	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	○	休薬		
	ゲムシタピン (GEM)	点滴静注	1250mg/m ²	○	休薬	○	休薬

2000070	トラスツズマブBS (3週間毎) +VNR						
2000080	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2 ~ day7	day8	day9 ~ day21
	トラスツズマブ	点滴静注	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	○	休薬		
	ビノレルビン (VNR)	点滴静注	25mg/m ²	○	休薬	○	休薬

2000152	トラスツズマブBS (3週間毎) +DTX					前投薬：パロセトロン 0.75mg、デキサメタゾン 6.6mg	
2000162	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2 ~ day21		
	トラスツズマブ	点滴静注	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	○	休薬		
	ドセタキセル (DTX)	点滴静注	60mg/m ²	○			

2000171	ベルツズマブ+トラスツズマブBS						
2000181	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2 ~ day21		
	ベルツズマブ	点滴静注	初回840mg 2回目以降420mg	○	休薬		
	トラスツズマブ	点滴静注	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	○			

2000053	ベルツズマブ+トラスツズマブBS+DTX					前投薬：パロセトロン 0.75mg、デキサメタゾン 6.6mg	
2000063	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2 ~ day21		
	ベルツズマブ	点滴静注	初回840mg 2回目以降420mg	○	休薬		
	トラスツズマブ	点滴静注	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	○			
	ドセタキセル (DTX)	点滴静注	75mg/m ²	○			

2000092	ベルツズマブ+トラスツズマブBS+GEM	前投薬：パロセトロン0.75mg、デキメタゾン6.6mg					
2000102	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day7	day8	day9～day21
	ベルツズマブ	点滴静注	初回840mg 2回目以降420mg	○	休薬		
	トラスツズマブ	点滴静注	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	○			
	ゲムシタピン (GEM)	点滴静注	1250mg/m ²	○	休薬	○	休薬

2000130	ベルツズマブ+トラスツズマブBS+VNR	前投薬：デキメタゾン6.6mg					
2000141	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day7	day8	day9～day21
	ベルツズマブ	点滴静注	初回840mg 2回目以降420mg	○	休薬		
	トラスツズマブ	点滴静注	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	○			
	ピノレルピン (VNR)	点滴静注	25mg/m ²	○	休薬	○	休薬

2000193	FEC100	前投薬：パロセトロン0.75mg、デキメタゾン6.6mg±ホスファレイト150mg					
2000202	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day21		
	エピルピシン (EPI)	点滴静注	100mg/m ²	○	休薬		
	シクロホスファミド (CPA)	点滴静注	500mg/m ²	○			
	5-FU	点滴静注	500mg/m ²	○			

2000223	TC	前投薬：パロセトロン0.75mg、デキメタゾン6.6mg					
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day21		
	ドセタキセル (DTX)	点滴静注	75mg/m ²	○	休薬		
	シクロホスファミド (CPA)	点滴静注	600mg/m ²	○			

2000230	アブラキサン®(nab-PTX) A法						
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day21		
	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	点滴静注	260mg/m ²	○	休薬		

2000240	ハラヴェン®(エリブリン)	前投薬：デキメタゾン6.6mg					
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day7	day8	day9～day21
	エリブリン	点滴静注	1.4mg/m ²	○	休薬	○	休薬

2000260	ベバシズマブ(BV)+PTX	前投薬：ファミジン20mg、クロルフェニミン5mg、デキメタゾン6.6mg							
2000262	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day7	day8	day9～day14	day15	day16～day28
	パクリタキセル (PTX)	点滴静注	90mg/m ²	○	休薬	○	休薬	○	休薬
	ベバシズマブ(BV)	点滴静注	10mg/kg	○	休薬			○	

2000280	カドサイラ®(トラスツズマブエムタンシン)	前投薬：デキサメタゾン 6.6mg			
2000290	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day21
	トラスツズマブエムタンシン	点滴静注	3.6mg/kg	○	休薬

イブランス®(パルボシクリブ) + レトロゾール					
	薬品名	投与方法	投与量	day1～day21	day22～day28
	パルボシクリブ	経口	125mg/回 1日1回	→	休薬
	レトロゾール	経口	2.5mg/回 1日1回	連日投与	

イブランス®(パルボシクリブ) + フルベストラント								
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2-day14	day15	day16-day21	day22-day28
	パルボシクリブ	経口	125mg/回 1日1回	→				休薬
	フルベストラント	筋肉内投与	500mg	○	休薬	(初回○)	休薬	

ベージニオ®(アベマシクリブ) + フルベストラント							
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2-day14	day15	day16-day28
	アベマシクリブ	経口	150mg/回 1日2回	連日投与			
	フルベストラント	筋肉内投与	500mg	○	休薬	(初回○)	休薬

※術後薬物療法時は24ヵ月までの投与

ベージニオ®(アベマシクリブ) + レトロゾールorアナストロゾール				(手術不能又は再発乳がん)	
	薬品名	投与方法	投与量	服用中	
	パルボシクリブ	経口	150mg/回 1日2回	連日投与	
	レトロゾール 2.5mg or アナストロゾール 1mg	経口	1日1回		

※術後薬物療法時は24ヵ月までの投与

2000320	EC	前投薬：パロセトロン 0.75mg、デキサメタゾン 6.6mg ± アピレキッド			
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day21
	エピルピシン (EPI)	点滴静注	90mg/m ²	○	休薬
	シクロホスファミド (CPA)	点滴静注	600mg/m ²	○	