

# 大腸がん

2200340	ロンサーフ®+ベバシズマブ(BV) (4週間毎)	前投薬：デキサメタゾン 6.6mg											
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2 ~ day5	day6	day7	day8	day9-12	day13	day14	day15	day16-day28
	ベバシズマブ(BV)	点滴静注	5 mg/kg	○	休薬							○	休薬
	トリフルリジン・チペラシル (TAS-102)	経口	1回35mg/m <sup>2</sup> 1日2回	夕○	朝○	夕○	○朝	休薬	夕○	朝○	夕○	○朝	休薬

2200013	FOLFIRI±ラムシルマブ(RAM)	前投薬：パロセトロン 0.75mg、デキサメタゾン 6.6mg、(+RAM時 クロルフェニラミン 5mg)				
2200023	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2 ~ day3	day4-14
2200203	ラムシルマブ(RAM)	点滴静注	8 mg/kg	○	休薬	
2200213	イリノテカン (CPT-11)	点滴静注	150 mg/m <sup>2</sup>	○		
	レボホリナート(I-LV)	点滴静注	200 mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル(5-FU)	急速静注	400 mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル(5-FU)	持続静注	2400 mg/m <sup>2</sup>	→(46時間)		

2200063	FOLFIRI±ベバシズマブ(BV)	前投薬：パロセトロン 0.75mg、デキサメタゾン 6.6mg				
2200073	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2 ~ day3	day4-14
2200203	ベバシズマブ(BV)	点滴静注	5 mg/kg	○	休薬	
2200213	イリノテカン (CPT-11)	点滴静注	150 mg/m <sup>2</sup>	○		
	レボホリナート(I-LV)	点滴静注	200 mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル(5-FU)	急速静注	400 mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル(5-FU)	持続静注	2400 mg/m <sup>2</sup>	→(46時間)		

2200102	FOLFIRI±パニツムマブ	前投薬：パロセトロン 0.75mg、デキサメタゾン 6.6mg				
2200113	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2 ~ day3	day4-14
2200203	パニツムマブ	点滴静注	6mg/kg	○	休薬	
2200213	イリノテカン (CPT-11)	点滴静注	150mg/m <sup>2</sup>	○		
	レボホリナート(I-LV)	点滴静注	200mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル(5-FU)	急速静注	400mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル(5-FU)	持続静注	2400mg/m <sup>2</sup>	→(46時間)		

2200081	mFOLFOX6±ベバシズマブ(BV)	前投薬：パロセトロン0.75mg、デキメタゾン6.6mg				
2200091	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day3	day4-14
2200221	ベバシズマブ(BV)	点滴静注	5mg/kg	○	休薬	
2200231	オキサリプラチン(I-OHP)	点滴静注	85mg/m <sup>2</sup>	○		
	レボホリナート(I-LV)	点滴静注	200mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル(5-FU)	急速静注	400mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル(5-FU)	持続静注	2400mg/m <sup>2</sup>	→(46時間)		休薬

2200121	mFOLFOX6±パニツムマブ	前投薬：パロセトロン0.75mg、デキメタゾン6.6mg				
2200131	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day3	day4-14
2200221	パニツムマブ	点滴静注	6mg/kg	○	休薬	
2200231	オキサリプラチン(I-OHP)	点滴静注	85mg/m <sup>2</sup>	○		
	レボホリナート(I-LV)	点滴静注	200mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル(5-FU)	急速静注	400mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル(5-FU)	持続静注	2400mg/m <sup>2</sup>	→(46時間)		休薬

2200181	CapeOX130 ±ベバシズマブ(BV)	前投薬：パロセトロン0.75mg(or グラセトロン3mg)、デキメタゾン6.6mg					
2200191	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day14	day15	day16～day21
2200241	ベバシズマブ(BV)	点滴静注	7.5 mg/kg	○	休薬		
2200252	オキサリプラチン(L-OHP)	点滴静注	130 mg/m <sup>2</sup>	○	休薬		
	カベシタビン(Cape)	経口	1000 mg/m <sup>2</sup> /回 1日2回	夕○	朝○ 夕○	○朝	休薬

2200181	SOX130 ±ベバシズマブ(BV)	前投薬：パロセトロン0.75mg(or グラセトロン3mg)、デキメタゾン6.6mg					
2200191	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day14	day15	day16～day21
2200241	ベバシズマブ(BV)	点滴静注	7.5 mg/kg	○	休薬		
2200252	オキサリプラチン(L-OHP)	点滴静注	130 mg/m <sup>2</sup>	○	休薬		
	テガフル・ギメラシル・オテラシル(S-1)	経口	40 mg/m <sup>2</sup> /回 1日2回	夕○	朝○ 夕○	○朝	休薬

※S-1使用時の体表面積は藤本式を用いる

2200163	IRIS±パニツムマブ	前投薬：グラセトロン3mg、デキメタゾン6.6mg					
2200167	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day14	day15	day16-day28
2200153	パニツムマブ	点滴静注	6mg/kg	○	休薬	○	休薬
	イリノテカン(CPT-11)	点滴静注	125mg/m <sup>2</sup>	○		○	
	テガフル・ギメラシル・オテラシル(S-1)	経口	40 mg/m <sup>2</sup> /回 1日2回	夕○	朝○ 夕○	○朝	

※S-1使用時の体表面積は藤本式を用いる

2200173	IRIS±ベバシズマブ	前投薬：ゲラニセトロン 3mg、デキサメタゾン 6.6mg					
2200153	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day14	day15	day16-day28
	ベバシズマブ(BV)	点滴静注	5mg/kg	○	休薬	○	休薬
	イリノテカン (CPT-11)	点滴静注	125mg/m <sup>2</sup>	○		○	
	テガフル・ギメラシル・オテラシル (S-1)	経口	40 mg/m <sup>2</sup> /回 1日2回	夕○	朝○ 夕○	○朝	

※S-1使用時の体表面積は藤本式を用いる

2200260	sLV5FU2±ベバシズマブ(BV)	前投薬；デキサメタゾン 6.6mg					
2200271	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day3	day4-14	
2200281	ベバシズマブ(BV)	点滴静注	5mg/kg	○	休薬		
2200290	レボホリナート(I-LV)	点滴静注	200mg/m <sup>2</sup>	○			
	フルオロウラシル(5-FU)	急速静注	400mg/m <sup>2</sup>	○			
	フルオロウラシル(5-FU)	持続静注	2400mg/m <sup>2</sup>	→(46時間)		休薬	

2200320	sLV5FU2±パニツムマブ	前投薬；デキサメタゾン 6.6mg					
2200331	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day3	day4-14	
2200281	パニツムマブ	点滴静注	6mg/kg	○	休薬		
2200290	レボホリナート(I-LV)	点滴静注	200mg/m <sup>2</sup>	○			
	フルオロウラシル(5-FU)	急速静注	400mg/m <sup>2</sup>	○			
	フルオロウラシル(5-FU)	持続静注	2400mg/m <sup>2</sup>	→(46時間)		休薬	

22000310	S-1±ベバシズマブ(BV)	前投薬；デキサメタゾン 6.6mg					
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day14	day15	day16-day21
	ベバシズマブ(BV)	点滴静注	7.5mg/kg	○	休薬		
	テガフル・ギメラシル・オテラシル (S-1)	経口	40 mg/m <sup>2</sup> /回 1日2回	夕○	朝○ 夕○	○朝	休薬

2200053	イリノテカン(CPT-11)±パニツムマブ	前投薬：ゲラニセトロン 3mg、デキサメタゾン 6.6mg					
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2～day14		
	パニツムマブ	点滴静注	6mg/kg	○	休薬		
	イリノテカン (CPT-11)	点滴静注	150mg/m <sup>2</sup>	○			