

# 胃がん

2100011	トラスツズマブBS+CDDP+Cape/S-1	前投薬：ショートハイドレーション、叔アブ <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> タト 150mg、パ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> セ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ン 0.75mg、テ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> メ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> ジ <sup>®</sup> ン 9.9mg							
2100021	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2	day3-day14	day15	～	day21
	トラスツズマブ	点滴静注	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	○	← 休薬 →				
	シスプラチン (CDDP)	点滴静注	80mg/m <sup>2</sup>	○					
	カペシタビン (Cape) 又は テガフル・ギメラシル・オテラシル (S-1)	経口	1回 1000mg/m <sup>2</sup> 1日2回朝夕食後 1回40mg/m <sup>2</sup> 1日2回 朝夕食後	夕○	朝○ 夕○	→	○朝	休薬	

※S-1使用時の体表面積は藤本式を用いる

2100051	SOX100 +トラスツズマブBS	前投薬：パ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> セ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ン 0.75mg、テ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> メ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> ジ <sup>®</sup> ン 6.6mg							
2100061	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2	day3-day14	day15	～	day21
2100092	トラスツズマブ	点滴静注	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	○	← 休薬 →				
2100102	オキサリプラチン (L-OHP)	点滴静注	100mg/m <sup>2</sup>	○					
	テガフル・ギメラシル・オテラシル (S-1)	経口	1回40mg/m <sup>2</sup> 1日2回 朝夕食後	夕○	朝○ 夕○	→	○朝	休薬	

※S-1使用時の体表面積は藤本式を用いる

2100071	CapeOX130 / SOX130 +トラスツズマブBS	前投薬：パ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> セ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ン 0.75mg、テ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> メ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> ジ <sup>®</sup> ン 6.6mg							
2100081	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2	day3-day14	day15	～	day21
2100112	トラスツズマブ	点滴静注	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	○	← 休薬 →				
2100122	オキサリプラチン (L-OHP)	点滴静注	130mg/m <sup>2</sup>	○					
	カペシタビン (Cape) 又は テガフル・ギメラシル・オテラシル (S-1)	経口	1回 1000mg/m <sup>2</sup> 1日2回朝夕食後 1回40mg/m <sup>2</sup> 1日2回 朝夕食後	夕○	朝○ 夕○	→	○朝	休薬	

※S-1使用時の体表面積は藤本式を用いる

2100151	オブジーボ <sup>®</sup> (ニボルマブ)								
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2	～	day14		
	ニボルマブ	点滴静注	240mg/body	○	← 休薬 →				

2100250	オプジーボ® 480mg (ニボルマブ)						
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2	~	day28
	ニボルマブ	点滴静注	480mg/body	○	← 休薬 →		

2100160	サイラムザ® (ラムシルマブ) + PTX	前投薬：フェモチゾン 20mg、ケルフェニミン 5mg、デキメタゾン 6.6mg					
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day8	day15	day16 ~ day28
	ラムシルマブ	点滴静注	8mg/kg	○	休薬	○	休薬
パクリタキセル (PTX)	点滴静注	80mg/m <sup>2</sup>	○	○	○		

2100220	サイラムザ® (ラムシルマブ) (単剤)	前投薬：ケルフェニミン 5mg				
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2-14	
	ラムシルマブ	点滴静注	8mg/kg	○	休薬	

2100231 2100241	SOX100	前投薬：パロセトロン 0.75mg、デキメタゾン 6.6mg							
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2	day3-day14	day15	~	day21
	オキサリプラチン (L-OHP)	点滴静注	100mg/m <sup>2</sup>	○	← 休薬 →				
	テガフル・ギメラシル・オテラシル (S-1)	経口	1回40mg/m <sup>2</sup> 1日2回 朝夕食後	夕○	朝○	夕○	→	○朝	休薬

※S-1使用時の体表面積は藤本式を用いる

2100181 2100191	SP	前投薬：ショートハイドレーション、ホスファタント 150mg、パロセトロン 0.75mg、デキメタゾン 9.9mg							
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2	day3-day14	day15	~	day35
	シスプラチン (CDDP)	点滴静注	60mg/m <sup>2</sup>	○	← 休薬 →				
	テガフル・ギメラシル・オテラシル (S-1)	経口	1回40mg/m <sup>2</sup> 1日2回 朝夕食後	夕○	朝○	夕○	→	○朝	休薬

※S-1使用時の体表面積は藤本式を用いる

2100201	ドセタキセル + S-1	前投薬：グラネセトロン 3mg、デキメタゾン 6.6mg							
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2	day3-day14	day15	~	day21
	ドセタキセル (DTX)	点滴静注	40mg/m <sup>2</sup>	○	← 休薬 →				
	テガフル・ギメラシル・オテラシル (S-1)	経口	1回40mg/m <sup>2</sup> 1日2回 朝夕食後	夕○	朝○	夕○	→	○朝	休薬

※S-1使用時の体表面積は藤本式を用いる

2100210	パクリタキセル (毎週) E法	前投薬：フェモジソン 20mg、ケルフェニミン 5mg、デキサメタゾン 6.6mg					
	薬品名	投与方法	投与量	day1	day2	～	day7
	パクリタキセル	点滴静注	80mg/m <sup>2</sup>	○	← 休薬 →		

	ロンサーフ® (TAS-102)							
	薬品名	投与方法	投与量	day1 ~ day5	day6-day7	day8~day12	day13 ~ day28	
	トリフルリジン・チペラシル (TAS-102)	経口	1回35mg/m <sup>2</sup> 1日2回	朝○ 夕○	→	休薬	朝○ 夕○	→